



ПЕРСЕН®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕРСЕН® (PERSEN®)

Регистрационный номер:

П N016317/01

Торговое название:

ПЕРСЕН® / PERSEN®

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Валерианы корневищ экстракт+
Мелиссы лекарственной травы
экстракт+Мяты экстракт

Лекарственная форма:

Таблетки, покрытые оболочкой

Состав:

1 таблетка, покрытая оболочкой содержит:

состав ядра: *активные вещества*:
экстракт валерианы сухой - 50,000 мг;
экстракт мелиссы сухой - 25,000 мг;
экстракт мяты перечной сухой - 25,000 мг;
вспомогательные вещества: тальк,
магния стеарат, кросповидон,
крахмал кукурузный, кремния
диоксид коллоидный, целлюлоза
микрористаллическая, лактоза; состав
оболочки: гидроксипропилцеллюлоза
(Hypromellose, Pharmacoat), тальк,
натрий-карбоксиметилцеллюлоза,
повидон, сахароза, кремния диоксид
коллоидный, кальция карбонат, титана
диоксид, краситель коричневый 75,
глицерин, воск E Hoechst (Capol 600).

Описание:

Круглые, двояковыпуклые темно-коричневые таблетки, покрытые оболочкой.

Фармакологическая группа:

Седативное средство растительного происхождения

Код АТХ: N05CM

Фармакологические свойства:

Препарат обладает успокаивающим и спазмолитическим действием.

Экстракт корневищ с корнями валерианы оказывает успокаивающее действие.

Экстракт листьев мелиссы - успокаивающее и спазмолитическое.

Экстракт листьев мяты перечной - спазмолитическое, умеренное успокаивающее действие.

Показания к применению:

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, раздражительность.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы;
- артериальная гипотензия;
- холангит, желчнокаменная болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей;
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 12 лет.

С осторожностью

У пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая водой, независимо от приема пищи.

Взрослые и дети старше 12 лет:

при повышенной нервной возбудимости, раздражительности - по 2-3 таблетки, покрытые оболочкой, 2-3 раза в день; при бессоннице - по 2-3 таблетки, покрытые оболочкой, за 30 минут - 1 час перед сном.

Максимальная дневная доза составляет 12 таблеток в день.

При прекращении лечения синдрома отмены не возникает.

Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (гиперемия, кожная сыпь, периферические отеки, аллергический дерматит), бронхоспазм, при длительном применении – запор.

Передозировка:

Однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (примерно 103 таблетки Персена®) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, дрожание рук, расширение зрачков, которые могут исчезнуть самостоятельно в течение 24 часов.

При явлениях передозировки целесообразно провести промывание желудка и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами:

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, гипотензивных препаратов (в частности, центрального действия), обезболивающих средств, что требует коррекции доз.

Особые указания:

У пациентов с ГЭРБ возможно ухудшение симптомов.

Если во время использования препарата симптомы сохраняются или утяжеляются, следует проконсультироваться с врачом.

Не следует применять препарат непрерывно более 1,5-2 месяцев.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения препаратом

следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска:

Таблетки, покрытые оболочкой

Первичная упаковка:

По 10 таблеток в блистер из алюминиевой/поливинилхлоридной фольги.

Вторичная упаковка:

По 2, 4, 6 или 8 блистеров в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения:

При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности:

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель

Держатель РУ: Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения.

Произведено: Лек д.д. Веровшкова 57, г. Любляна, Словения.

Организация, принимающая претензии потребителей:

ЗАО «Сандоз», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3; телефон: (495) 660-75-09; факс: (495) 660-75-10.

